

**Cambodian - Pediculosis (Head Lice)**

**ការកើតមានជាហ្នូង**



**ជំងឺចៃ (ចៃក្បាល)**

**ចំណុចសំខាន់ៗ**

- ភាគច្រើនចៃក្បាលកើតមានជាទូទៅ នៅក្នុងចំណោមក្មេងសាលា។ វាមិនសូវកើតមាននៅក្នុងចំណោមទារកទេ
- គេមិនអាចមើលឃើញចៃដោយស្រួលឡើយ ក៏ប៉ុន្តែគេអាចមើលឃើញពងចៃនៅជាប់ស្និតនឹងសក់ ។
- ត្រូវប្រើថ្នាំកំចាត់ចៃ ឬទឹកសាប៊ូកំចាត់ចៃ ហើយត្រូវប្រើស្របទៅតាមការណែនាំ មួយអាទិត្យក្រោយមកត្រូវកំចាត់ចៃទៀត
- ប្រើសាប៊ូកំចាត់ចៃទូទាំង ដើម្បីជួយឱ្យងាយស្រួលក្នុងការសឹកយកពងចៃ និងចៃជាមួយស្និត
- ប្រើសាប៊ូកំចាត់ចៃទូទាំង និងស្និត រហូតទាល់តែលេងឃើញមានពងចៃនៅលើសក់ក្បាល
- គ្រប់ទាំងសមាជិកគ្រួសារដែលមានចៃ ត្រូវតែព្យាបាលដើម្បីកុំឱ្យឆ្លងនៅក្នុងគ្រួសារទៀត
- មិនត្រូវប្រើក្រាសសិតសក់ ច្រាសត្រដុសសក់ មួក និងគ្រឿងពាក់ក្បាលរួមគ្នាឡើយ

**តើវាជាអ្វី?**

ចៃក្បាលគឺជាសត្វល្អិតគ្មានស្នាម ដែលបណ្តាលឱ្យមានការរមាស់ស្បែកលើក្បាល។ វាចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារឈាមមនុស្ស ហើយច្រើនរស់នៅ ហើយពងដាក់សក់ផ្នែកខាងក្រោយក្បាល និងក និងខាងក្រោយត្រចៀក។ មនុស្សភាគច្រើនត្រូវបានប្រតិកម្មទៅនឹងចៃ និងពងវា ហើយបណ្តាលឱ្យរមាស់។ ការអះអាងបណ្តាលឱ្យលាក់ស្បែក (ក្រហម ស្នាយ ឬសម្បុរភ្លេត) ដែលមានចេញទឹក និងក្រមរ។

មិនមែនមនុស្សគ្រប់ៗគ្នាសុទ្ធតែមានប្រតិកម្មទៅនឹងចៃទេ ហើយមនុស្សទាំងនេះអាចមានចៃក្បាល ក៏ប៉ុន្តែឥតរមាស់ ឬឥតបង្ហាញសញ្ញាប្រាប់អ្នកដទៃអំពីវត្តមាននៃការមានចៃក្បាលទេ។

ចៃក្បាលកើតមានជាទូទៅនៅក្នុងចំណោមក្មេងចូលសាលារៀន មគ្គុយសាលា ឬកន្លែងមើលថែរក្សាក្មេង។ វាកម្រកើតមាននៅក្នុងចំណោមទារកណាស់។ កុមារទាំងនេះត្រូវបានរំលែកពិនិត្យមើល ដោយសារការរកឃើញចៃក្បាល ឬពងរបស់វាជាប់ស្និតទៅនឹងសក់ គឺនៅក្បែរស្បែកលើក្បាល។ មិនដូចអង្កែកក្បាលទេ គេពុំអាចសឹកយកពងចៃជាមួយក្រាសធម្មតាឡើយ។

ចៃរស់នៅលើលើក្បាល ហើយពងដាក់សក់។ ចៃមានទំហំប្រហែលស្មើនឹងក្បាលម្តូល ហើយមនុស្សភាគច្រើនមានចៃចំនួនតែ៥-១០ចំណុះនៅលើលើក្បាលរបស់គេ ដូច្នេះប្រហែលជាការពិបាកនឹងមើលឃើញវាណាស់។ ផ្ទុយទៅវិញ មានពងចៃប្រហែលជាប់រយជាប់ស្និតទៅនឹងសក់ ដែលគេអាចមើលឃើញវាយ៉ាងងាយស្រួល។ ការប៉ះក្បាលគ្នា ឬប្រើមួកដូចគ្នា ការប្រើគ្រឿងពាក់ក្បាល ឬក្រាសសិតសក់រួមគ្នា នាំឱ្យឆ្លងចៃពីម្នាក់ ទៅម្នាក់ទៀត។ ចៃមិនអាចរស់នៅឆ្ងាយពីខ្លួនមនុស្សលើសពីរ ឬបីនាទីឡើយ។

**វាគេការពារវាដោយរបៀបណា?**

គ្រប់ទាំងសមាជិកគ្រួសារដែលមានចៃ ត្រូវតែព្យាបាលដើម្បីការពារកុំឱ្យឆ្លងនៅក្នុងគ្រួសារទៀត។ គេមិនត្រូវប្រើក្រាសសិតសក់ ច្រាសត្រដុសសក់ ឬគ្រឿងពាក់ក្បាលរួមគ្នាទេ។ ត្រូវលាងសំអាតច្រាសត្រដុសសក់ និងក្រាសសិតសក់ជាមួយទឹកយ៉ាងក្តៅ ហើយសម្អាតវាដោយយកចិត្តទុកដាក់។

**តើគេអាចព្យាបាលវាដោយរបៀបណា?**

ត្រូវប្រើថ្នាំកំចាត់ចៃក្បាល ពេលណាលោកអ្នកមើលឃើញចៃ ឬពងចៃនៅសក់របស់កូនក្មេង។ ដើម្បីរំលែកមើលចៃក្បាល លោកអ្នកអាចប្រើសាប៊ូកំចាត់ចៃទូទាំង និងស្និត នេះគឺជារបៀបដែលអាចប្រើសំរាប់កំចាត់ចៃក្បាល។

ដើម្បីកំចាត់ចៃដោយប្រើតាមរបៀបនេះ ត្រូវប្រើស្និតសិតសាប៊ូកំចាត់ចៃទូទាំង ចេញពីសក់ស្និត ដោយចាប់ពីលើក្បាល ចុះទៅចុងសក់។ រឹកសក់ជាស្រទាប់ៗ ដូចសាប៊ូកំចាត់ចៃទូទាំងដាក់ទៅលើក្រដាសដូតមាត់ ដើម្បីច្រូតយកពង និងចៃចេញ។ ត្រូវសិតស្រទាប់សក់នីមួយៗឱ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនប្រាំដង។ កាលណាលេងឃើញមានចៃ ឬពងនៅលើស្និតសិតសក់ ត្រូវលាងជំរះក្បាលទាំងមូលជាមួយទឹកក្តៅ២០០។ បញ្ហានេះអាចកើតមានឡើងជាថ្មីទៀត ប្រសិនបើឃើញមានពងរស់នៅលើស្និតសិតសក់។ ត្រូវរំលែកមើលសក់កុមារតាមរបៀបនេះឱ្យបានរៀងរាល់អាទិត្យ។ មានថ្នាំកំចាត់ ឬសាប៊ូកំចាត់ចៃក្បាលមួយចំនួន ដែលអាចរកបានពីឱសថស្ថាន។ មិនមែនគ្រប់អស់ទាំងថ្នាំកំចាត់ចៃក្បាល ល្អសមរម្យសំរាប់កូនក្មេង និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទេ ដូច្នេះសូមរំលែកមើលឱ្យបានហ្មត់ចត់ជាមួយឱសថករ។ ថ្នាំទាំងនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាព ប្រសិនបើប្រើស្របទៅតាមការ

## Cambodian - Pediculosis (Head Lice)

ណែនាំ។ តាមធម្មតាដើម្បីកំចាត់ចែ និងពងចេញពីសក់ គេត្រូវការប្រើថ្នាំចំនួនពីរលើក ដែលមានចំនួនពេលវេលាគ្នា។

ក្បាលអាចនេរមាស់អស់រយៈពេលមួយអាទិត្យ ក្រោយពីបានកំចាត់ចែចេញអស់ហើយ។ ការឆេះអាចបណ្តាលឲ្យស្បែកវាក្លាយ ដោយមានចេញ ទឹក ហើម និងគ្រុនបន្តិចបន្តួច។ ប្រសិនបើការនេះកើតមានឡើង សូមអញ្ជើញទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក។

នេះគឺជាការសំខាន់ដែលត្រូវតែកមើលកូនក្មេងឲ្យបានរៀងរាល់អាទិត្យ ដោយប្រើរបៀប "Conditioner and Comb" (របៀបកំចាត់ចែ ដោយប្រើសាប៊ូកំចាត់ចែ និងស្និត) ឲ្យបានពីរ ឬបីអាទិត្យ បន្ទាប់ពីបានប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការ ព្យាបាល។

### ព័ត៌មានបន្ថែមទៀត

- គិលានុបដ្ឋាយិកាមើលថែទាំសុខភាពមាតា និងកុមារ
- ឱសថការីរបស់លោកអ្នក
- វេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក
- វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជម្ងឺសើរស្បែក