

**Cambodian - Impetigo (school sores)**

**ជម្ងឺឆ្មុះលើស្បែក - វាយវិស**



# ជម្ងឺឆ្មុះលើស្បែក - ជំងឺសាលា

## ចំណុចសំខាន់ៗ

- ជម្ងឺឆ្មុះលើស្បែក គឺជាមេរោគបាក់តេរីផ្នែកខាងលើស្បែក
- ជម្ងឺឆ្មុះលើស្បែក ច្រើនកើតមាននៅលើមុខ ដៃ ឬជើង
- ជម្ងឺឆ្មុះលើស្បែកគឺជាជម្ងឺឆ្លង ហើយអាចឆ្លងរាលដាលពីសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ ទៅម្នាក់ទៀត ហើយពីក្មេងសាលាម្នាក់ ទៅម្នាក់ទៀត
- ជម្ងឺឆ្មុះលើស្បែក អាចព្យាបាលជាមួយថ្នាំទឹកសម្ងាត់មេរោគស្បែក។ គេអាចប្រើថ្នាំដឹកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ឬក្រុមអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ប្រើពីលើស្បែក ដើម្បីព្យាបាលផងដែរ។

## តើវាជាអ្វី?

ជម្ងឺឆ្មុះលើស្បែក គឺជាមេរោគឆ្លងនៅលើស្បែក ដែលបណ្តាលឲ្យក្រៀម ចេញទឹក ហើយជួនកាលពងខ្ទុះនៅលើស្បែក។ វាលេចចេញក្នុងរយៈពេលពីរ ឬបីថ្ងៃពីលើស្បែកដូចជានៅលើមុខ ឬដៃជើង។ ពេលខ្លះវាអាចឆ្លងរាលដាលដល់ដងខ្លួន។

វាជាជម្ងឺមួយដែលឆ្លងខ្លាំងណាស់ ហើយអាចឆ្លងរាលដាលពីសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ ទៅម្នាក់ទៀត ឬអាចឆ្លងរាលដាលពីក្មេងសាលាម្នាក់ ទៅម្នាក់ទៀត។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេដាក់ឈ្មោះវាថា "school sores" (ជំងឺសាលា)។

ធម្មតាជម្ងឺនេះមិនបណ្តាលឲ្យកើតមានរោគសញ្ញាអ្វីឡើយ ហើយមិននាំឲ្យកើតមានស្លាកស្នាមអ្វីទេ។ ជួនកាលវាអាចកើតមានជម្ងឺស្បែក ដូចជាជម្ងឺរលាកស្បែក។ ការនេះអាចបណ្តាលឲ្យជម្ងឺរលាកស្បែកកើតមានការតែឆ្លងឆ្លូរឡើង ដែលមានចេញទឹក និងក្រៀមលឿង។

## តើគេព្យាបាលវាដោយរបៀបណា?

ជម្ងឺឆ្មុះលើស្បែកអាចចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីការអះរមាស់ដែលបណ្តាលមកពីសត្វល្អិតខាំ ឬពីការដាច់ស្បែកបន្តិចបន្តួច។ ដើម្បីការពារកុំឲ្យកើតមានជម្ងឺនេះ គេត្រូវប្រើថ្នាំសម្ងាត់មេរោគនៅត្រង់កន្លែងមុត ឬដាច់ស្បែក។

ការលាងសំអាតស្បែកដែលមានមេរោគជាមួយថ្នាំទឹកសម្ងាត់មេរោគ ហើយប្រើក្រុមសម្ងាត់មេរោគដែលវេជ្ជបណ្ឌិតចេញបញ្ជាឲ្យប្រើ អាចជួយព្យាបាលជម្ងឺឆ្មុះលើស្បែកដែលមិនធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រសិនបើជម្ងឺនេះវាឆ្លងរាលដាលខ្លាំង វេជ្ជបណ្ឌិតអាចចេញថ្នាំដឹកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិក ដើម្បីប្រើជាមួយថ្នាំសម្ងាត់មេរោគ។

កុមារដែលកើតជម្ងឺឆ្មុះលើស្បែក ត្រូវតែដាក់ឲ្យបាននៅឆ្ងាយពីក្មេងទៀត។ ក្នុងរយៈពេល២៤ម៉ោងបន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្តើមព្យាបាលជាមួយថ្នាំដឹកអង់ទីប៊ីយ៉ូទិកមក កុមារនឹងឈប់ចម្លងមេរោគ ហើយឈប់ឆ្លងរាលដាលទៅដល់អ្នកដទៃទៀត។

## ព័ត៌មានបន្ថែមទៀត

- គិលានុបដ្ឋាយិកាមើលថែទាំសុខភាពមាតា និងកុមារ
- ឱសថការីរបស់លោកអ្នក
- វេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក
- វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជម្ងឺស្បែក