


# Cambodian - Infantile Seborrhoeic Dermatitis Cradle Cap

## ជម្ងឺរលាក



## ជម្ងឺកមក្សាល

### ចំណុចសំខាន់ៗ

- ជម្ងឺកមក្សាលមិនមែនជារមាស់ទេ ហើយមិនជាអ្វីដែលទារកឡើយ
- ធៀសវាងសាប៊ូ ដោយហេតុថាវាអាចធ្វើឲ្យក្រហាយដល់ការរលាកស្បែក
- ប្រើប្រេងដាក់ត្រាំក្នុងទឹកដែលពុំមានក្លរូស ជំនួសសាប៊ូ
- ប្រើក្រុមការពារកុំឲ្យស្បែក ដូចជាក្រុម aqueous ឬក្រុម sorbolene
- ប្រើប្រេងអូលីវលាបលើស្បែកលណាជ័ក្សាលឲ្យបានច្រើនដង ក្នុងមួយអាទិត្យដើម្បីយកក្រុមចេញ
- ជម្ងឺកមក្សាលជាបាត់អស់ទៅវិញក្នុងចំណោមទារកភាគច្រើន នៅពេលចូលដល់អាយុប្រហែល២ខែ ឬច្រើនជាងនេះ។

### តើវាជាអ្វី?

ជម្ងឺកមក្សាលគឺជាជម្ងឺរលាកស្បែកទូទៅ ដែលអាចទាក់ទងនឹងស្បែកលណាជ័ក្សាល និងផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនរបស់កុមារតូចៗ។ មិនដូចជម្ងឺត្រអកកុមារឡើយ ជម្ងឺកមក្សាលមិនរមាស់ទេ។ នៅក្នុងចំណោមទារកទើបនឹងកើតភាគច្រើន វាតែងបាត់ទៅវិញនៅក្នុងអាយុពីរខែ។ ការនេះខុសពីជម្ងឺត្រអកកុមារ ដែលចេះតែកើតមានបន្ទាប់ពីអាយុពីរខែ ហើយចេះតែកើតមានតទៅទៀត។ សណ្ឋានទូទៅ ហើយមិនសូវខ្លាំងដែលចំណាយស្បែកលណាជ័ក្សាល កូនក្មេង ត្រូវបានគេហៅថាជម្ងឺកមក្សាល។

### តើវាកើតនៅកន្លែងណា?

នៅក្នុងទារកភាគ កន្លែងដែលចំណាយទូទៅជាងគេគឺស្បែកលណាជ័ក្សាលដែលគេឃើញខ្លាញ់ក្រមរច្បាស់ ពណ៌សលឿងៗបន្តិច ដុះក្រាស់នៅ ជាប់សក់ ឬស្បែកលណាជ័ក្សាល។ វាអាចរាលដាលចុះមកដល់កណ្តាលមុខ ពីក្រោយត្រចៀក ឬនៅលើកញ្ជីងក។ វាអាចកើតមាននៅកន្លែង ពាក់កណ្តាល និងក្បែកផងដែរ ដែលមានពណ៌ក្រហមច្រើនជាងក្រមរ ហើយជាញឹកញយមានជាប់ទាក់ទងនឹងផ្គត់ផ្គង់ត្រលៀន។ ជម្ងឺកមក្សាលដែលចំ ពាល់ដល់ផ្គត់ផ្គង់ត្រលៀន ជាទូទៅអាចក្លាយទៅជាជម្ងឺជ្រាំង។

### តើគេព្យាបាលវាដោយរបៀបណា?

ប្រសិនបើវាជាជម្ងឺកមក្សាលបន្តិចបន្តួច គេអាចព្យាបាលវាជាមួយក្រុមធ្វើឲ្យសើមស្បែកដូចជាក្រុម aqueous ឬក្រុម sorbolene ឬប្រេង អូលីវក៏បានដែរ។ ប្រសិនបើវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគេអាចលាបប្រេងទាំងនេះជាមួយក្រុម salicylic acid cream (ក្រុមជាតិអាស៊ីដសាលីស៊ីលិក) ឬក្រុម cortisone cream (ក្រុមខទីហ្សូន) មិនសូវខ្លាំងដែលត្រូវបានណែនាំដោយឱសថការី ឬវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក។

ជម្ងឺកមក្សាលនៅកន្លែងពាក់កណ្តាល ជាញឹកញយអាចព្យាបាលដោយលាបជាមួយប្រេងដាក់ត្រាំក្នុងទឹក ហើយប្រើក្រុមជំនួសសាប៊ូដុំ ដូចជាប្រេង aqueous cream ឬប្រេង emulsifying ointment (ប្រេងលាបស្បែកដែលធ្វើឲ្យរាវ)។ ប្រេង cortisone cream ដែលមិនសូវខ្លាំង អាចត្រូវបានណែនាំដោយវេជ្ជបណ្ឌិត សំរាប់ប្រើជាមួយក្រុមបន្ថែមដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺជ្រាំង។ ប្រសិនបើកើតមានកន្ទួលនៅលើមុខ គេអាច ប្រើក្រុម cortisone cream ដែលមិនសូវខ្លាំងចំនួនមួយថ្ងៃ ឬពីរថ្ងៃ បន្ទាប់មកត្រូវប្រើជាមួយក្រុមធ្វើឲ្យសើមស្បែកឲ្យបានទៀងទាត់។

### ព័ត៌មានបន្ថែមទៀត

- គិលានុបដ្ឋាយិកាមើលថែទាំសុខភាពមាតា និងកុមារ
- ឱសថការីរបស់លោកអ្នក
- វេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក
- វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជម្ងឺសើមស្បែក