

Chinese - Impetigo (School Sores)

Infections – bacterial 感染 – 細菌



膿皰瘡(校瘡)

要點

- 膿皰瘡是一種皮膚表面的細菌感染
- 膿皰瘡好發部位包括臉頰、兩臂或兩腿
- 膿皰瘡具傳染性，可從家裡一個人傳染給另一人，或在學校從一個學生傳染給另一個學生
- 對膿皰瘡可採用皮膚抗菌溶液治療，也可能需要口服抗生素或外搽抗生素乳膏

甚麼是膿皰瘡？

膿皰瘡是一種會引起滲出膿液和結痂的細菌感染，有時皮膚表面有水皰。膿皰在幾天中逐漸出現在臉上和四肢皮膚，並可能蔓延擴展到軀幹。

膿皰瘡具有高度的傳染性，可從家裡一個人傳給另一人，或在學校學生中間傳播，因此俗稱“校瘡”。

膿皰瘡感染通常沒有任何症狀也不留下疤痕。有時可能會發生在患濕疹的皮膚上，這可導致濕疹加重，滲出膿液和結成黃痂。

如何治療膿皰瘡？

膿皰瘡可能在蟲咬後抓破的皮膚或從其他略有損傷的皮膚開始發生。為了預防膿皰瘡，應對傷口或皮膚抓破處施用抗菌藥物。

用醫生開的抗菌溶液清洗感染的皮膚和搽用醫生開出的抗菌乳膏可治療輕微的膿皰瘡。如果膿皰瘡蔓延開了，醫生可能開口服抗生素，讓您在服用抗菌藥物時同時服用。

膿皰瘡患兒應與其他小兒隔離。在開始口服抗生素治療 24 小時後，小兒就不再具有傳染力並不能把病菌傳播給別人。

Chinese - Impetigo (School Sores)

更詳盡的訊息

婦幼保健護士

藥劑師

家庭醫生

皮膚科醫生

© 2002, Department of Dermatology, St. Vincent's Hospital Melbourne,
Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065 Australia.