

Infestations 寄生蟲侵擾



蝨咬傷

要點

- 多數蝨咬傷發生在臉部或手臂等暴露部位
- 有時，在蟲子於衣內爬過的身體部位會出現一簇簇蝨咬傷
- 熱使瘙癢加劇
- 用濕冷的面巾冷卻患處可有所幫助
- 抗組胺乳膏可能有作用，但要注意是否會過敏
- 抗組胺口服藥水可能有助於睡眠
- 如果抓破皮膚，搽用抗菌防腐藥可預防感染

甚麼是蝨咬傷？

蝨咬傷是局部皮膚對被各種昆蟲注入皮膚中毒液的反應。蝨咬傷非常普通，有些小兒比他人更為敏感。蟲子在皮膚上造成一或數個小傷口，成為日後幾天的瘙癢部位。有時會有水皰，腿上尤其多見。

蝨咬傷發生在甚麼部位？

多數蝨咬傷發生在蟲子能夠到達的皮膚暴露部位。在蟲子於衣內爬過的身體部位有時會出現一簇簇蝨咬傷。

有時小兒會對蝨咬傷發生過敏反應。然後可能在遠離患處的地方出現好像蝨咬傷的簇簇紅腫。例如，腿上的蝨咬傷可能會導致身體和上肢出現一簇簇紅腫塊。這些紅腫塊會隨時間而消失，但是小兒以後被同樣的蟲咬了，可能還會發生過敏。

如何治療蝨咬傷？

蝨咬傷的主要特點是瘙癢，熱時尤劇。用濕冷的面巾冷卻患處可有所幫助。有的小兒皮膚上搽抹了爐甘石水劑或其他冷卻品會感到舒適一些。

有時也可使用抗組胺藥，但會引起過敏性皮炎。如果在搽軟膏的部位開始出現皮疹，應立即停藥。如果瘙癢嚴重，夜間影響小兒睡眠，服用家庭醫生建議的抗組胺口服藥水可能有效用。

Chinese - Insect Bites

如果患處過份搔抓引起流液結成硬皮，就有細菌感染的危險。在這種情況下，搽用抗菌防腐藥可預防感染。

多數蟲咬傷在幾天內可消褪。如果瘙癢腫塊持續不褪，或者出現更多腫塊，就須尋求醫生的進一步指導，以確定這些腫塊是否非蟲子咬傷所致。

更詳盡的訊息

婦幼保健護士

藥劑師

家庭醫生

© 2002, Department of Dermatology, St. Vincent's Hospital Melbourne, Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065 Australia.