

Cambodian - Postpartum Hair Loss

ជម្ងឺកើតមាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សជំនង់



ជម្ងឺខ្លះសក់ក្រោយពីសំរាលកូន

ចំណុចសំខាន់ៗ

- ជម្ងឺខ្លះសក់ក្រោយពីសំរាលកូន មិនមែនជាការជ្រុះសក់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេ
- តាមធម្មតាមានសក់ប្រហែលជា១០០,០០០សរសៃ ដុះនៅលើស្បែកលលាដ៍ក្បាល ហើយជាទូទៅមានសក់ប្រហែលជា៥០-២០០សរសៃ ជ្រុះរៀងរាល់ថ្ងៃ
- ការកើនកំរិតជាតិអ៊ីម៉ូន (hormone) នៅពេលមានផ្ទៃពោះ ធ្វើឲ្យសក់នៅស្បែកលលាដ៍ក្បាលដុះច្រើនជាងធម្មតា
- ក្រោយពីសំរាលកូនហើយ កំរិតជាតិអ៊ីម៉ូន ក៏ត្រឡប់ទៅភាពធម្មតាវិញ ហើយពីរ ទៅបីខែក្រោយមកក៏មានសក់ជ្រុះច្រើនឡើងកើតមាន អស់រយៈពេលពីរ ទៅបីខែ
- ការដុះសក់នឹងត្រឡប់មកធម្មតាវិញ ចាប់ពីបី ទៅប្រាំមួយខែបន្ទាប់ពីសក់ចាប់ផ្តើមជ្រុះ
- ជម្ងឺខ្លះសក់ក្រោយពីសំរាលកូន អាចកើតមានរៀងរាល់ពេលមានផ្ទៃពោះ

តើវាជាអ្វី?

ស្ត្រីជាច្រើននឹងកត់សំគាល់ឃើញមានការជ្រុះសក់បន្ទាប់ពីមានផ្ទៃពោះ។ ជាតិអ៊ីម៉ូនដែលកើនឡើងនៅពេលមានផ្ទៃពោះ នាំឲ្យមានការប្រែប្រួល នៅស្បែក និងផ្នែកដទៃទៀតជាច្រើននៃដងខ្លួន។ វាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យសក់ស្បែកលលាដ៍ក្បាលទាំងអស់ ចូលដល់ដំណាក់កាលដុះសក់នៃសក់ដែល ត្រូវដុះឡើងវិញនោះ។ ការនេះមានន័យថាស្ត្រីជាច្រើនសង្កេតឃើញសក់របស់ខ្លួន ហាក់ដូចជាដុះក្រាស់នៅពេលមានផ្ទៃពោះ។

ក្រោយពីទារកបានកើតមក សក់ជាច្រើនក៏ឈប់ដុះ ហើយក៏ចូលដល់ដំណាក់កាលសំរាក ដែលវាស្ថិតនៅដដែលអស់រយៈពេលពីរ ទៅបីខែ។ កាល ណាការដុះសក់ឡើងវិញចាប់ផ្តើមជាថ្មី នោះសក់ក៏វិលត្រឡប់ចូលក្នុងដំណាក់កាលដុះ ហើយសក់ចាស់ក៏ចាប់ផ្តើមជ្រុះក្នុងពេលជាមួយគ្នាគ្នា។ ចំនួននៃការជ្រុះសក់នឹងប្រែប្រួលស្របទៅតាមបុគ្គលម្នាក់ៗ ដែលមានស្ត្រីខ្លះសង្កេតឃើញសក់របស់ខ្លួន ជ្រុះច្រើនជាងសក់ស្ត្រីដទៃទៀត។ ប្រសិនបើ មានទំនោរទៅរកសក់ស្លើងកើតមាននៅក្នុងគ្រួសារ ការជ្រុះសក់ក៏អាចឃើញកាន់តែច្បាស់បន្ទាប់ពីទារកបានកើតមក។

ជម្ងឺខ្លះសក់ក្រោយពីសំរាលកូន ជាទូទៅកើតមានអស់រយៈពេលពីរ ទៅបីខែ បន្ទាប់មកសក់ក៏ចាប់ផ្តើមដុះសារជាថ្មីឡើងវិញ។ នៅក្នុងចំណោម ស្ត្រីភាគច្រើន សក់វិលត្រឡប់មករកភាពដូចមុនពេលមានផ្ទៃពោះ។

វាត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងណា?

ពុំចាំបាច់ត្រូវការព្យាបាលជម្ងឺខ្លះសក់ក្រោយពីសំរាលកូនឡើយ។ វាគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្តូររូបរាងសាស្ត្រ នៅក្នុងដំណើរសក់ជ្រុះដែលត្រូវដុះ ឡើងវិញប៉ុណ្ណោះ ដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលជាតិអ៊ីម៉ូននៅពេលមានផ្ទៃពោះ។

ការត្រដុះសក់ និងសិតសក់ច្រើនហួសហេតុ និងរំលើងសក់ចេញយ៉ាងងាយ ព្រមទាំងបង្កើនល្បឿនជ្រុះសក់ចេញពីក្បាលផង ដែលតាមធម្មតាវា ត្រូវប្រើពេលពីរ ទៅបីខែ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តី ប្រសិនបើការនេះកើតឡើង នោះវានឹងមិនធ្វើឲ្យខូចសក់ក្នុងបែបណាមួយឡើយ។ ការប្រើថ្នាំ វីតាមីន ឬថ្នាំលាបនៅស្បែកលលាដ៍ក្បាល នឹងមិនធ្វើឲ្យខុសប្លែកអ្វីទេ។ ស្ត្រីខ្លះកត់សំគាល់ឃើញថាជម្ងឺខ្លះសក់ក្រោយពីសំរាលកូន កើតមាន រៀងរាល់ពេលមានផ្ទៃពោះ។

ព័ត៌មានបន្ថែមទៀត

- គិលានុបដ្ឋាយិកាមើលថែទាំសុខភាពមាតា និងកុមារ
- វេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក
- អ្នកឯកទេសខាងសំរាលកូន