

Zaraze



Svrab

Važne napomene

- **Osobna nečistoća nije uzrok svraba.**
- **Svrab se prenosi bliskim kontaktom sa zaraženom osobom.**
- **Svi članovi obitelji koji imaju blizak kontakt sa osobom koja ima svrab trebaju se istodobno liječiti.**
- **Liječiti treba cijelu površinu tijela osim tjemena i lica te idući dan sprati. Ako se u međuvremenu peru ruke, tretman na njima treba ponoviti.**
- **Osip i svrbež traju 2-3 tjedna nakon odgovarajućeg tretmana protiv svrabnih crvića.**
- **Nakon prvog tretmana djeca mogu ići u školu.**

Što je to?

Svrab je svrabljivo stanje kože kojeg uzrokuju sićušni crvići koji se razmnožavaju i žive u površinskom sloju ljudske kože. Oni žive jedino u ljudskim bićima. Neke životinje mogu biti zaražene crvićima ali je rijetkost da ovi životinjski crvići naškode ljudima.

Kod svraba dolazi do sveopćeg svrbeža i pjegavog osipa (crvenog na bijeloj a ljubičastog ili smeđeg na pigmentiranoj koži) po tijelu i udovima. Obično ga nema na vratu i glavi. Svrbež je gori tijekom noći i na vrućini. Crvići se podvuku ispod kože, osobito oko noktiju ali i po rukama i stopalima male djece. Ponekad, na ovim dijelovima tijela izaziva male plikove. Crvići se također nalaze na laktovima, ispod pazuha, na penisu i mošnjama.

Kako se prenosi?

Svrab se obično prenosi bliskim kontaktom sa inficiranom osobom, npr., držanjem za ruke. Često se prenosi među članovima obitelji. Prenosi se i kada se djeca zajedno igraju. Osobna nečistoća nije uzrok svraba. Crvići svraba ne mogu preživjeti van ljudskog tijela pa se prema tome ne mogu dobiti sa namještaja i prostirki.

Kako se sprečava?

Tretman je potreban svim članovima obitelji i drugim osobama koje su imale kontakt sa zaraženom osobom bez obzira imaju li simptome svraba ili ne. Tretman zaražene osobe i svih onih koji su imali kontakt sa tom osobom je najvažniji čimbenik za sprečavanje širenja zaraze.

Kako se liječi?

Većina osoba može se liječiti losionom ili kremom koja ubija žive crviće. Treba se posavjetovati sa liječnikom kako bi se odredio najbolji tretman. Treba se namazati kremom ili losionom od glave do pete i pri tome obratiti najviše pozornosti na ruke i pregibe na koži oko genitalija. Kremu ili losion treba ostaviti oko 24 sata a idući dan sprati toplom vodom. Ukoliko su se u

Croatian - Scabies

međuvremenu prale ruke, potrebno je ponovo ih namazati kremom ili losionom.

Istodobno bi trebalo podvrgnuti tretmanu sve članove obitelji. Posteljinu s kreveta i odjeću koja se nosila nekoliko zadnjih dana bi trebalo oprati vrućom vodom i deterdžentom što bi trebalo ubiti crviće. Ponekad je potreban i drugi tretman.

Jednom kada se obavi tretman, može proći 2-3 tjedna da se svrabljivi osip smiri. Liječnik može prepisati kortizon kremu protiv svrbeža i dermatitisa koji bi se mogao pojaviti kao rezultat svraba. Nakon prvog tretmana, djeca mogu krenuti u školu.

Više informacija

Vaša medicinska sestra za zdravlje majke i djeteta.

Vaš ljekarnik.

Vaš obiteljski liječnik.

Dermatolog.

© 2002, Department of Dermatology, St. Vincent's Hospital Melbourne, Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065 Australia.