

Φλεγμονώδη Νοσήματα



Βρεφικό (τοξικό) Ερύθημα

Σημαντικά σημεία

- Το βρεφικό ερύθημα είναι κηλίδες ερυθρού εξανθήματος.
- Συμβαίνει στο 50% των νεογέννητων τα οποία διαφορετικά είναι απολύτως καλά.
- Η αιτία είναι άγνωστη.
- Δεν είναι μια λοίμωξη ή κάτι που μεταδίδεται από την μητέρα στο παιδί πριν τον τοκετό.
- Δεν χρειάζεται θεραπεία.
- Το εξάνθημα συνήθως καταστέλλεται τελείως σε δύο εβδομάδες.

Τι είναι;

Το βρεφικό ερύθημα είναι πολύ συνηθισμένο και συμβαίνει σε μέχρι και 50% υγιών νεογέννητων. Εμφανίζεται ως ερεθισμένες κηλίδες στο περισσότερο μέρος του σώματος που έρχονται και φεύγουν. Σε μελανότερες επιδερμίδες μπορεί να είναι χρώματος μοβ ή σκούρο καστανό. Το παιδί είναι τελείως καλά και δεν ενοχλείται από το εξάνθημα.

Αρχίζει με κηλίδες πλάτους 2-3 εκατοστών που μπορεί να έχουν μια κεντρική φυσαλίδα. Οι αριθμός των κηλίδων ποικίλει από εκατό έως διακόσιες. Συνήθως παρουσιάζεται στον κορμό, ειδικά στο στήθος. Μπορεί να εμφανιστούν επίσης και σε άλλα μέρη του σώματος όπως στο πρόσωπο, βραχίονες και πόδια.

Το εξάνθημα γενικά αρχίζει στις πρώτες λίγες μέρες της ζωής και καθαρίζει μέχρι το νήπιο γίνει δύο εβδομάδες. Μερικές φορές παραμένει μέχρι και τέσσερις εβδομάδες. Σπάνια, μπορεί να επανεμφανιστεί στις πρώτες έξι εβδομάδες.

Ποια είναι η αιτία;

Η αιτία του βρεφικού ερυθήματος είναι άγνωστη. Δεν είναι μια αλλεργική αντίδραση στο γάλα ή φάρμακα που μεταδίδεται από την μητέρα στο παιδί. Δεν είναι λοίμωξη.

Greek - Erythema (Toxicum) Neonatorum

Πώς αντιμετωπίζεται;

Δεν χρειάζεται θεραπεία. Δεν σχετίζεται με οποιαδήποτε άλλα προβλήματα υγείας και το παιδί είναι απολύτως καλά.

Περισσότερες πληροφορίες

Νοσοκόμα Υγείας Μητέρας και Παιδιού της περιοχής σας.

Φαρμακοποιός σας.

Οικογενειακός σας γιατρός.

Δερματολόγος.

© 2002, Department of Dermatology, St. Vincent's Hospital Melbourne, Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065 Australia.