

Воспалительные заболевания



Крапивница

Что важно помнить

- В большинстве случаев причина приступа крапивницы остается неизвестной
- Предполагается, что чаще всего заболевание носит вирусный характер
- Крапивница может быть вызвана аллергией к какому-то пищевому продукту
- Во время приступа избегайте тепла и старайтесь как можно сильнее охладить кожу
- Врач может выписать антигистаминовый сироп, который, если принять его быстро, помогает при особо острых приступах
- Кремы и примочки мало чем помогают

Что такое крапивница

Дети часто болеют крапивницей. Она проявляется в виде красных рубцов на коже, которые возникают в течение нескольких минут, вызывают сильный зуд, и примерно через час исчезают без следа. Иногда крапивница у детей выглядит как кровоподтеки. Во время приступа тепло ухудшает состояние и усиливает зуд.

В каких местах на теле появляется крапивница

Может появиться в любом месте, включая лицо, туловище, руки и ноги. Приступы чаще всего продолжаются несколько дней, в течение которых рубцы появляются и исчезают. Иногда приступы повторяются в течение многих месяцев.

Отчего возникает крапивница

В большинстве случаев причина приступа крапивницы остается неизвестной. Предполагается, что у детей заболевание чаще всего носит вирусный характер, хотя в остальном дети при этом здоровы. В этих случаях крапивница обычно проходит меньше чем за неделю, хотя потом иногда повторяется в сочетании с другими заболеваниями.

Бактериальная инфекция также может вызвать приступ крапивницы, и в этом случае может потребоваться антибиотик. Она также может возникнуть в результате аллергической реакции на какой-то пищевой продукт, например, клубнику или морепродукты. Иногда крапивницу могут вызвать лекарства, такие как пенициллин.

Russian – Urticaria (Hives)

Лечение

Зуд и красные рубцы на коже появляются из-за того, что при аллергической реакции в организме вырабатывается гистамин. Поэтому для лечения крапивницы врач выписывает антигистаминовый сироп, который в большинстве случаев помогает. Во время приступа любое тепло усиливает зуд, поэтому если вы постараетесь охладить ребенка с помощью вентилятора, или наложив влажную холодную ткань на те места, где у него зуд, то это ослабит зуд и может даже сократить время приступа.

Если крапивница возникает как реакция на пищевой продукт, то приступ обычно начинается в пределах 12 часов после еды. При повторении приступов, постарайтесь вспомнить, что именно ребенок ел в течение предыдущих 12 часов – возможно вам удастся определить, какой именно продукт вызывает крапивницу и избегать его в будущем.

Где получить дополнительную информацию

У медсестры по уходу за детьми младшего возраста.

У фармацевта.

У семейного врача.

У врача-дерматолога или аллерголога, специализирующегося в лечении крапивницы.

© 2002, Department of Dermatology, St. Vincent's Hospital Melbourne, Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065 Australia.