

Инфекције- фунгалне



### Кандида (Ојед) код беба

#### Важне тачке

- Кандида у устима се може појавити након узимања антибиотика
- Кандида се појављује у кожи која је већ упаљена
- Пажљиво осушите кожу након купања
- Што више избегавајте употребу пластичних гаћица или пелена
- Лечење кандиде на кожи може укључити креме кортизона и посебне препарате против кандиде преписане од лекара
- Када се појави у устима, постоји гел или капи против кандиде
- Да спречите кандиду у пределу пелене
  - често мењајте пелене
  - оперите и пажљиво осушите предео пелене
  - заштитите кожу на препонама и пределу пелена са заштитним средством, као парафином или цинк кремом

#### Шта је то?

Кандида или ојед је честа инфекција коже коју изазивају гљивични албикани кандиде. Воли да расте у топлим и влажним местима као што су уста (орална кандида), преклопима коже у препонама, око задњице или повремено испод мишки.

У устима изазива једну или више белих храпавих кругова повезаним са црвенилом. Најчешће се појављује у унутрашњости образа, а понекад на непца, палаталу (врх уста) или језику.

Кандида се појављује дубоко у преклопима коже, као и око препона и задњице. Затим се шири низ бедра или задњицу у супротном правцу од контакта коже. Не појављује се на нормалној кожи, тако да се најчешће појави екцем (дерматитис) који постане инфициран кандидом. Ово је честа појава у пределу пелене који је топао и влажан. Инфицирана кожа постане црвена са могућим перутањем са стране и тачкицама које се шире супротно од преклопа коже.

#### Шта је изазива?

У 20% општег становништва кандида постоји без изазивања проблема у устима. Ако дође до промене у локалним условима, као што је употреба антибиотика, може доћи до прераста кандиде. Храна која остане у устима, укључујући слатке напитке и млеко, такође може допринети развоју оралне инфекције кандиде.

Влага и топлота у флексурама (преклопинма коже), нарочито где је дерматитис такође присутан, пре ће изазвати кандидну инфекцију коже. Ако се кандида појави у дерматитису у флексурама, употреба

## **Serbian – Candida (Thrush) in Babies**

креме кортизона без упореде употребе третмана против кандиде може погоршати кандиду.

### **Како се лечи?**

Посебни третмани против кандиде укључују креме за подручје пелене и гел или капи за уста. Креме се могу препоручити заједно са благом кремом кортизона за какав присутан дерматитис. Ако мајка има кандиду вагине или брадавица, биће јој потребно лекарско лечење.

У опште мере спречавања услова у којима кандида воли да се шири спадају:

- престати са антибиотицима што је пре могуће
- пажљиво осушити све преклопе коже након купања
- употреба комотне одеће како би се спречило прегрејавање
- адекватно лечење било каквог подложног дерматитиса или оједа због пелена

### **Даље информације**

Ваша медицинска сестра за негу мајке и детета.

Ваш апотекар.

Ваш породични лекар.

Дерматолог.

*Сродан информативни лист: Екцем/Кандида (Ојед) Брадавице*

© 2002, Department of Dermatology, St. Vincent's Hospital Melbourne, Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065 Australia.