

Стања упале



## Erythema (Toxicum) Neonatorum

### Важне тачке

- Erythema neonatorum је црвен осип налик на мрљу
- Појављује се у 50% новорођенчади која су иначе потпуно здрава
- Узрок није познат
- То није инфекција, нити нешто што се преноси с мајке на дете пре порођаја
- Лечење није потребно
- Осип обично потпуно нестане у року од две седмице

### Шта је то?

Erythema neonatorum је врло честа, појављујући се до у 50% здравих новорођенчади. Појављује се као црвенило по скоро целом телу, а долази и одлази. У тамнијој кожи може бити пурпурне или тамно браон боје. Дете је потпуно здраво и није угрожено осипом.

Почиње са мрљама 2-3 см у ширини који могу имати мали централни плик. Број тачака може бити од једне или две до стотина. Најчешће се појављује у централном делу тела, нарочито на грудима. Такође се може појавити на другим местима као на лицу, рукама и ногама.

Осип обично почиње у првих неколико дана живота и нестане док дете дође до две недеље узраста. Понекад је присутно до четири седмице. Ретко када се може поново појавити у првих шест седмица.

### Шта га изазива?

Узрок erythema neonatorum није познат. То није алергична реакција на млеко или лекове која се преноси с мајке на дете. То није инфекција.

### Како се може лечити?

Лечење није потребно. Није повезано ни са једним здравственим проблемом и дете је потпуно здраво.

### Даље информације

Ваша медицинска сестра за здравље мајке и детета.

Ваш апотекар.

Ваш породични лекар.

Дерматолог.