

Инфестације



Pediculosis (Вашке)

Важне тачке

- Вашке се најчешће појављују код школске деце. Обично не код беба
- Вашке је тешко уочити, али могуће је видети јаја залепљена за косу
- Лосионе или шампоне против вашки треба користити према упутству и поновити седмицу касније
- Може се употребити омекшивач за косу, како би било лакше уклонити јаја и вашке са чешљом за вашке
- Омекшивач и чешаљ за вашке треба користити док се јаја више не могу видети на власима
- Сви чланови породице који су добили вашке треба да се третирају како би се унутар породице спречила даља инфекција
- Чешљеве, четке, капе и укоснице не треба делити с другим

Шта је то?

Вашке су инсекти без крила који изазивају свраб скалпа. Хране се људском крвљу и имају обичај да живе и лежу јаја на темену, врату и иза ушију. Већина људи постану алергични на вашке и њихова јаја, што изазове свраб. Чешање чини да кожа постане упаљена (црвена, пурпурна или браон) са лучењем и крастама.

Нису сви људи алергични на вашке и они могу имати вашке без свраба, и да буду свесни да их имају.

Вашке се најчешће појављују код деце у школи, обданишту или вртићу. Ретко се појављују код беба. Дијагнозира се тако што се пронађу вашке или јаја залепљена за власи близу скалпа. За разлику од перути, јаја се не могу исчешљати обичним чешљем.

Вашке живе у скалпу лежући јаја на власима. Вашке су величине врха игле, а већина људи имају свега 8-10 вашки на скалпу, тако да их је тешко уочити. Супротно томе, може бити на стотине јаја причвршћених за косу којих је лакше уочити. Контакт главе уз главу или коришћењем истих капа, укосница или чешљева преносе се вашке са особе на особу. Вашке не могу опстати одвојене од људског тела више од неколико минута.

Како се могу спречити?

Сви чланови породице који су их добили треба да буду третирани, како би се спречила даља инфекција у породици. Не треба делити чешљеве, четке или укоснице. Четке и чешљеве треба опрати врелом водом и пажљиво осушити.

Како се може лечити?

Препарате против вашки треба користити само ако видите вашке или јаја у дететовој коси. Да проверите да ли има вашки, можете употребити нормалан омекшивач косе и чешаљ за вашке, метод који се такође може користити као третман.

Да лечите користећи овај метод, учешљајте омекшивач кроз суву косу од скалпа до врха косе, користећи чешаљ за вашке.

Serbian – Pediculosis (Head Lice)

Прочешљајте косу по деловима, бришући омекшивач са чешља марамицом, како би уклонили сва јаја и вашке. Кроз сваки део треба прочешљати најмање 5 пута. Када на чешљу више не будете видели вашке или јаја, исперите целу главу топлом водом. Проблем се може поновити ако која жива јаја остану на власима. Дете би требало преконтролисати сваке седмице користећи овај метод.

Постоји низ лосиона или шампона против вашки у апотекама. Не одговарају сва малој деци или трудницама и зато пажљиво проверите са апотекарем. Ови препарати могу бити ефикасни када се примене према инструкцијама. Третман обично захтева две примене препарата у размаку од седам дана, како би се из косе уклониле све вашке и јаја.

Глава може сврбети недељу дана након одстрањења вашки. Чешање може изазвати инфекцију коже са лучењем, отеклим жлездама и благом температуром. Уколико се то деси, посетите вашег породичног лекара.

Још увек је важно контролисати дете сваке седмице користећи метод омекшивача и чешља 2-3 седмице након употребе инсектицида, како би били сигурни да је третман био ефикасан.

Даље информације

Ваша медицинска сестра за здравље мајке и детета.

Ваш апотекар.

Ваш породични лекар.

Дерматолог.