

Инфестације



Шуга

Важне тачке

- Шуга се не појављује због лоше личне хигијене
- Шуга се преноси блиским контактом са особом која је има
- Све чланове породице које су у блиском контакту са особом са шугом треба третирати у исто време
- Третман треба применити по целом телу, осим на скалпу и лицу, и опрати следећег дана. Ако су у то време руке биле опране, третман треба поновити на рукама
- Може потрајати 2-3 седмице док се осип или свраб умири након адекватног третмана ваши која изазива шугу
- Деца могу да похађају школи након првог третмана

Шта је то?

Шуга је стање сврбљиве коже коју изазива мала ваш која живи и леже се у горњем слоју људске коже. Ова ваш живи само на људима. Неке животиње могу добити ваши, али ове животињске ваши ретко утичу на људе.

Шуга изазива распрострањен свраб и флекав осип (црвен на белу кожу, пурпуран или браон на тамнију кожу) на телу и удовима. Обично се не појављује на глави и врату. Свраб је гори ноћу и по врућини. Ваш копа по кожи, нарочито око прстију, али исто и на рукама и ногама мале деце. У овим местима може изазвати мале пликове. Ваши се такође могу наћи око лаката, мишки, на пенису и тестисима, као и око брадавице. Људи који га добију постану алергични на ваш у кожи. Добију распрострањен свраб и алергичан осип.

Како се преноси?

Шуга се често преноси на друге путем блиског контакта са зараженом особом, нпр. држањем руке. Често се преноси са једног члана породице на другог. Деца која се заједно играју често је преносе једно другом. Шуга се не појављује због лоше личне хигијене. Ваш која изазива шугу не може да преживи одвојена од људског тела, и зато се не може добити од тепиха или намештаја.

Како се спречава?

Све чланове породице и особе са блиским контактом са зараженом особом треба третирати, без обзира да ли изгледа да имају шугу или не. Третирање заражене особе, као и друге контакте, најважнији је фактор у спречавању ширења овог стања.

Како се лечи?

Већину људи је могуће третирати кремом или лосионом која се ставља на кожу и која убија живе ваши. Треба се саветовати с лекаром у одређивању најбољег третмана. Крему или лосион треба стављати од испод вилице до прстију на ногама, водећи посебно рачуна на руке и преклопе коже око гениталија. Треба је оставити до 24 часа и онда опрати следећег дана. Ако се руке оперу у ово време, крему или лосион треба поново ставити на руке.

Serbian - Scabies

Све чланове породице у блиском контакту треба третирати у исто време. Сву постељину у којој је проведена ноћ примене третмана, као и одећу ношену у последњих неколико дана, треба опрати. Нормално прање топлом водом са детерџентом биће довољно да убије ваш. Понекад се може препоручити други третман.

Чим је третман примењен, сврабу и осипу може требати 2-3 седмице да се умири. Лекар може преписати креме кортизона ради контроле свраба и било каквог дерматитиса који се може појавити као резултат шуге. Деца могу похађати школу после првог третмана.

Даље информације

Ваша медицинска сестра за здравље мајке и детета.

Ваш апотекар.

Ваш породични лекар.

Дерматолог.

© 2002, Department of Dermatology, St. Vincent's Hospital Melbourne, Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065 Australia.