

Singhalese - Viral Exanthems (Rashes Associated with Viruses)

වයිරස ආසාදනය



වෛරසයන් හා සම්බන්ධ පපි Viral Exanthems (Rashes Associated with Viruses)

හැඳින්වීම

වයිරස ආසාදනයන් බිලිඳුන් සහ තරුණු ලමයින් අතර පොදුය. බොහෝ විට එවා සම මත සුලු පපි ඇති කරයි. පැතලි රතු තැන්, ඉස්මතු වී පෙනෙන කුඩා තඹිස්සියක්, විසජ්ජවක්, weals (කෝටුවකින් තැලූවට ඇතිවන ලකුණක් වැනි) හෝ මේවා හා සම්බන්ධ වී හමේ ඇතිවන ලකුණු.

විවිධ වයිරසයන් විවිධ පපි හා සමග සම්බන්ධයක් ඇතත් ඇතැම්විට විවිධ වයිරසයන් එකම පපිව ඇති කළ හැක. නියත වශයෙන්ම මොන වෛරසයක් කිනම් පපිවක් ඇති කරන්නේද යන්න නිතර නිතර කිය නොහැක. සෑම පපි හා සම්බන්ධ විවිධ පොදු වයිරස පහතින් විග්‍රහ කර ඇත. මෙම තත්වයන් ආසාදනය (infectious) වන අතර සෘදුසු ස්පර්ශවීම නිසා ඇතිවේ.

Roseola Infantum

වයස අවුරුදු දෙකෙන් පහල ලමයින්ගේ උණ ඇති කරණ ඉතාමත්ම පොදු වයිරස ආසාදනයකි. එය වයස මාස 6-9 දක්වා ඉතාමත්ම පොදුය. උෂ්ණත්ව සෙන්ටිග්‍රේඩ් 39-40 දක්වා ක්ෂණයකින් ඇතිවන උණ දින 3-5 දක්වා පවතී. නොටිස්සීමේ ගතියක් ඇතිවීම හැර දරුවා යහපත් තත්වයක පවතී. බෙල්ල ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ (gland) විශාල වන අතර ශරීර උෂ්ණත්වය පහල බැසීමත් සමගම බෙල්ලේ සහ ශරීරයේ මා-රතු පාට ලප ඇතිවේ. එය, අත්, මුහුණ සහ කකුළු වලට පැතිරිය හැකි අතර දින 1-2 අතර මැකී යනු ඇත. කැසීම ඇති නොවන අතර ප්‍රවීකාර අවශ්‍ය නැත.

අත පය සහ මුඛ රෝග

මෙම වයිරස ආසාදනය වඩාත් පොදු වශයෙන් ශ්‍රීස්ම සහ ශරත් සෘතු වලදී බාල ලමයින්ට වැළඳෙනු දැකිය හැක. මෙය ගොවිපොළ වල සතුන්ට ඇති වන පාද සහ මුඛ රෝගය නොවේ. සාමාන්‍යයෙන් රෝග නිමිති මෘදු වන අතර ආරම්භයේදී ඇතිවන සුලු උණ ගතියක් දින හතක් පමණ කල් පවතී. මුඛයේ මතු වන කුඩා බිබිලි බොහෝවිට පුපුරා කුඩා වණ බවට පත්වේ. අණඩාකාර කලු මුතු ඇට වැනි පටු රතු කෙළවර සහිත බිබිලි ඇතිව, පයේ ඇඹිලි සහ විලුඹ අවට පැති වල හට ගනී. කුඩා බිබිලි ගණන වෙනස්ව පවතින අතර දින 2-3 ක් අතර මැකී යයි. කැසීමක් හෝ වේදනාවක් ඇති නොවේ. ප්‍රවීකාරයක් අවශ්‍ය නොවේ.

Erythema Infectiosum (Slapped Cheek/Fifth Disease)

මෙම වයිරස ආසාදනයේ සුලු පැතිරීම් වසන්ත කාලයේදී ඇතිවන අතර වයස අවුරුදු 2-10 ලමයින් අතර බහුලව හටගන්නා බවක් දැක්ක හැක. මෙම පපි කම්මුල් වල හට ගනී. රතු වී උග්‍රවේ. (එබැවින් “slapped cheek disease” යන නමින් සඳුන්වනු ලැබේ. පැය 24 ඇතුළත එය වර්ධනය වන අතර උණ තිබේ නම් සාමාන්‍යයෙන් සුලු වශයෙන් පමණි. ඕබිලි රේන්දුසක මෝස්තරය අනුව ශරීරය පුරා පැතිරිය හැක. සාමාන්‍යයෙන් එය දින 6-10 අතර මැකී යනු ඇත. ඊට පසු දරුවා උෂ්ණත්වයකට භාජනය වුව හොත් හෝ හිරු එලියට ලක්වුව හොත් අත්වල සහ කකුල්වල ඉදිරි සති කීපය තුළ නැවත මතු වේ. ඕබිලි වලට ප්‍රවීකාර අවශ්‍ය නැත.

සරම්ප (Measles)

එන්නත් නිසා සරම්ප සුලබය. කෙසේ වෙතත් එය සමාජයෙන් සම්පුර්ණයෙන්ම ඉවත් වී නැත. මෙම වයිරසයේ මුලික රෝග ලක්ෂණ වශයෙන් දින 3-5 දක්වා පවතින උණ, කැස්ස, රත් පැහැ තාස්පුඩු සහිත හෙම්බිරිස්සාව, ඇස් රිදීම ආදිය වේ. ශක්තිය හීන, නූරුස්සන ගති ඇති සාමාන්‍යයෙන් අසනීප ගතියන් දරුවා පෙන්නුම් කරයි.

Singhalese - Viral Exanthems (Rashes Associated with Viruses)

දෙවන දිනයේදී කම්මුල් ඇතුළත රතු වළල්ලක් ඇතුළත සුදට හුරු නිල් ප්‍රකාශය හට ගනී. හතරවන දිනයේදී නලලේ සහ කන පිටුපස රතු පඵවක් හටගෙන පැය 24 ඇතුළත මුහුණ ඇතුළු ශරීරයේ වෙනත් කොටස් වලට විහිදී යයි. සතිකට පමණ පසු මෙම පඵව සම මත දැඹුරු පාට කැලැල්ලක් තබා මැකී යනු ඇත. පොත්ත ගැලවිය හැක. බොහෝ අවස්ථාවලදී වැඩි දැඹුණුකරණයක් නොමැතිව ආසාදනය සම්පූර්ණයෙන්ම තැන්පත් වනු ලැබේ.

බිබිලි වලට නියමිත ප්‍රතිකාරයක් නොමැත. නමුත් දරුවාට ඇඳ මත විවේකිත ගත කිරීමට සැලැස්වීම, හැකි තරම් බිමට වතුර දීම, සහ දිප්තිමත් ජලය වැටීම වැළැක්වීමට වග බලා ගත යුතුවේ. කුඩා දරුවන්ට දෙන පැරසිටමෝල් Paracetamol උණ මර්ධනය කර ගැනීම සඳහා දිය යුතුවේ.

වැඩිපුර තොරතුරු

ඔබේ මාතෘ සහ ලමා සෞඛ්‍ය හේදිය

ඔබේ ඖෂධ වේදියා

ඔබේ පවුලේ දොස්තර මඟ/මිය

වරම රෝග විශේෂයෙක් (A dermatologist)

© 2002, Department of Dermatology, St. Vincent's Hospital Melbourne, Victoria Parade, Fitzroy, Victoria 3065 Australia.